

ชื่อยาทั่วไป	Tolperisone hydrochloride
ชื่อการค้า / ผู้ผลิต	Mydocalm®
รูปแบบ / ความแรง	Tablet 50 mg
กลุ่มยา	muscle relaxant
Pregnancy Category	A
ข้อบ่งใช้ที่ได้รับการรับรองจาก สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา	<u>ข้อบ่งใช้</u> เป็นยาคลายกล้ามเนื้อใช้บรรเทาอาการปวดจากการหดเกร็งของกล้ามเนื้อ <u>ขนาดยา</u> ขนาดยาที่แนะนำในการรักษา musculoskeletal disorders -ผู้ใหญ่: รับประทาน 150-300 mg ต่อวัน แบ่งให้วันละ 3 ครั้ง ขนาดยาที่ให้ได้ สูงสุด 450 mg ต่อวัน -เด็ก: อายุ 3 เดือนถึง 6 ปี รับประทานขนาด 5 mg/kg แบ่งให้วันละ 3 ครั้ง อายุ 6-14 ปี รับประทาน 2-4 mg/kg แบ่งให้วันละ 3 ครั้ง
เภสัชวิทยา	tolperisone acts at the level of spinal cord by blocking sodium channels and calcium channels. Tolperisone exerts its spinal reflex inhibitory action predominantly via a pre synaptic inhibition of the transmitter release from the primary afferent endings via a combined action on voltage-gated sodium and calcium channels.
เภสัชจลนศาสตร์	-
ข้อควรระวัง / ข้อห้ามใช้	ข้อห้ามใช้ยาของยา tolperisone 1. ผู้ที่เคยมีประวัติว่าแพ้ยา tolperisone 2. ผู้ป่วยโรค Myasthenia gravis 3. เด็กอายุต่ำกว่า 3 เดือน
อาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา	อาการข้างเคียงที่เกิดจากการรับประทานยา tolperisone 1. ทำให้ระดับความดันโลหิตในเลือดลดลง แต่ไม่ถึงกับทำให้เกิดความดันโลหิตต่ำ 2. ทำให้เกิดอาการคันและผื่นขึ้นได้ในกรณีที่ผู้ป่วยแพ้ยา แต่อาการที่เกิดขึ้นไม่รุนแรง 3. ทำให้เกิดอาการปากแห้ง ท้องไส้ปั่นป่วน ท้องเสีย 4. ทำให้เกิดภาวะกล้ามเนื้ออ่อนแรง แต่ที่รายงานมีน้อยกว่าร้อยละ 1

	5. ทำให้เกิดอาการง่วงนอน มึนงง อ่อนเพลีย ซึ่งพบได้บ่อยจากการใช้ยา tolperison
ค่าใช้จ่ายด้านยา	1 บาท